

**ET TOI ? Tu te
PROTÈGES DE LA
GONORRÉE ?**

**Oui, chaud
patate !**

ÇA SE VOIT ?

Des symptômes peuvent apparaître entre 2 à 7 jours après la contamination :

- Brûlures lorsqu'on urine.
- Écoulement jaune verdâtre par le vagin, la verge ou l'anus.
- Douleurs au vagin, au méat¹, au bas ventre.
- Fièvre.

➔ La gonorrhée peut également donner une infection de la gorge ou du rectum avec douleur, écoulement de pus, ténésme² et constipation. En cas de non traitement : risque d'infection des testicules, de la prostate, de l'utérus, des trompes, des ovaires, stérilité, arthrite. La co-infection avec la chlamydia est fréquente (dans 20 à 40% des cas).

➔ Les symptômes peuvent ne jamais apparaître alors que tu as infecté(e). Il faut donc te protéger et protéger ton/ta/tes partenaire(s) après une prise de risque.

1 Méat : orifice externe de l'urètre à l'extrémité du gland.

2 Ténésme : tension douloureuse au niveau de l'anus et du col de la vessie.





COMMENT TE DÉPISTER ?

Examen médical et prélèvement local, frottis. Possibilité de dépistage sur base d'un premier jet urinaire (urine du matin, ne pas avoir uriné dans les deux heures qui précèdent).

ÇA SE SOIGNE ?

Antibiotiques appropriés (le traitement ne protège pas contre une nouvelle infection). Attention, depuis peu, quelques cas de résistances par rapport à ces antibiotiques sont apparus dans certains pays.

COMMENT ÇA SE TRANSMET ?

Contacts sexuels non protégés : pénétration vaginale, anale, fellation, cunnilingus, anulingus, caresses sexuelles. Par transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement.

COMMENT TE PROTÉGER ?

Préservatif, carré de latex.





PARLEZ-EN



PROTÉGEZ-VOUS



DÉPISTEZ-VOUS ET
SOIGNEZ-VOUS

Tu peux évaluer le risque d'avoir été infecté(e) par une IST et trouver un lieu de dépistage proche de chez toi en surfant sur

WWW.PREVENTIONIST.ORG



Ed resp. Thierry Martin, Plate-Forme Prévention Sida,
151 rue Jourdan, 1060 Bruxelles.