

**ET TOI ? T'es  
vacciné(e) CONTRE  
L'HPV\* ?**

**Pas qu'un  
peu mon  
N'veu !**

**\*HUMAN PAPILLOMA VIRUS**

## ÇA SE VOIT ?

Des symptômes peuvent apparaître entre 1 à 8 semaines après la contamination :

- Petites verrues indolores, appelées **condylomes**, sur les organes génitaux ou l'anus (boursouflures ayant un aspect de chou-fleur).

Il existe d'autres types (souches) du virus HPV, pouvant être à l'origine du cancer du col de l'utérus (ou de l'anus). Le dépistage peut se faire par frottis<sup>1</sup> et dans certains cas, des lésions précancéreuses peuvent être détectées. Très souvent elles vont régresser. Dans le cas contraire, une intervention chirurgicale sera nécessaire pour éviter le cancer. Un bon suivi gynécologique est donc essentiel.

## COMMENT TE DÉPISTER ?

Examen médical et frottis du col de l'utérus (frottis de dépistage tous les 2 ans), à renouveler après le traitement car risque de récurrence.

1 Frottis : prélèvement médical sans douleur d'un liquide ou de cellules de l'organisme en vue d'un examen microscopique.



## ÇA SE SOIGNE ?

- Verrues soignées par une crème et si besoin, extraction locale des verrues ou traitement au laser.

## COMMENT ÇA SE TRANSMET ?

- Contact sexuel (oral, anal, vaginal, pénis).
- Contact cutané avec les lésions lors de caresses sexuelles (transmission par les doigts).
- Par transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement.

## COMMENT TE PROTÉGER ?

- Vaccin, recommandé pour les jeunes filles avant le premier rapport sexuel.
- Éviter tout contact de la bouche et des doigts avec les lésions.
- Préservatif si pénétration, tout en évitant tout contact avec les lésions.





PARLEZ-EN



PROTÉGEZ-VOUS



DÉPISTEZ-VOUS ET  
SOIGNEZ-VOUS

Tu peux évaluer le risque d'avoir été infecté(e) par une IST et trouver un lieu de dépistage proche de chez toi en surfant sur

**WWW.PREVENTIONIST.ORG**



Ed resp. Thierry Martin, Plate-Forme Prévention Sida,  
151 rue Jourdan, 1060 Bruxelles.